


'T IS GEBEURD

Een minikwis over pijn

Morfine...

1. Morfine werkt niet op nociceptieve pijn



2. Morfine werkt niet op neuropathische pijn



3. Morfine werkt beter op nociceptieve dan op neuropathische pijn



4. Morfine werkt beter op neuropathische dan op nociceptieve pijn



Blocks

1. Een Chordotomie kan veilig uitgevoerd worden bij een patiënt met verminderde longfunctie
 3.77%
2. Een Splanchnicusblock wordt enkel uitgevoerd voor een patiënt met een levensverwachting langer dan zes maand
 11.32%
3. Een Hypogastrisch Plexusblock is effectief voor bovenbuiktumoren
 66.04%
- ✓ 4. Een niercarcinoom kan een indicatie zijn voor Coeliacusblock
 18.87%

Dementie

1. Personen met dementie hebben in de terminale fase minder pijnproblemen dan kankerpatiënten



- ✓ 2. Personen met dementie hebben in de terminale fase meer pijnproblemen dan kankerpatiënten



3. Bij personen met dementie gebruik je best geen opiaten



4. Personen met dementie hebben geen pijngedrag



Trappen


1. Trap 1 geneesmiddelen zijn veiliger dan trap 3 geneesmiddelen



2. Bijwerkingen van trap 3 geneesmiddelen zijn dosisgebonden en patiëntspecifiek



3. Trap 2 geneesmiddelen zijn beter verdragen dan trap 3 geneesmiddelen



4. De bijwerkingen van trap 3 geneesmiddelen zijn tijdelijk en gaan na enkele dagen voorbij



PIJN

Molenheide, 11 april 2018

Koen Lauwers

Gert Huysmans


*Pijn is een onaangename sensorische
of emotionele ervaring samenhangend
met actuele of potentiële
weefselbeschadiging of beschreven in
termen van een dergelijke
beschadiging*

International association for the Study of Pain

*Pijn is datgene wat een persoon die
het ervaart zegt dat het is en is
aanwezig wanneer hij/zij zegt dat het
aanwezig is*

Mc Caffery

- Acute pijn >< chronische pijn
- Maligne pijn – niet maligne pijn
- Pijngeheugen
 - Modulatie
 - Modificatie
- Pijngedrag



Pijnbelevingsmodel volgens Loeser

Voorkomen

- 18 % ? volwassen bevolking
 - Hoofdpijn
 - Gewrichtspijnen
 - rugpijn
 - ...
- Vergeevorderd stadium na kanker 64 %
 - Pancreas, oesophagus 80%
 - Long, maag, prostaat, borst, cervix, ovarium 70-80 %
 - Orofarynx, colon, hersenen, nier, blaas 60-70 %
 - Hematologische maligniteiten 50-60 %

Voorkomen

- AIDS 40-50 % (80 % opgenomen patiënten)
- ALS 60-70 %
- Multipele sclerose 50-60 %
- Hartfalen 41 %
- COPD 68 %
- Terminale nierinsufficiëntie 40 %

Pijn als symptoom bij ouderen

- Onderrapportage
- Onderdiagnose
 - 40 à 80 % rusthuisbewoners heeft pijn
 - 50 % wordt correct behandeld
 - 20 % dementerenden wordt correct behandeld



Vergelijking van pijnbehandeling t.g.v. heupfractuur bij gevorderd dementeren en cognitief valiede bejaarden

Journal of Pain and Symptom Management vol. 19 No. 4 April 2000

niet-dementerend

dementerend

N	95	38
pijnschaal	0 tot 4	niet te testen
N = 4	40%	niet te testen
Opiaten	100	33
Routine analgesie	17%	24%


Gevolgen van onderbehandelde pijn

- Depressie ↑
- Sociale deprivatie ↑
- Slaapstoornissen ↑
- Mobiliteit ↓
- Gebruik gezondheidszorg ↑
- Revalidatie ↓
- Impact op zorgverleners ↑

FUNCTIONALITEIT






LEVENSQUALITEIT




PSYCHISCHE STRESS













A-delta vezel




C-vezel





- Elke behandeling eigen aangrijpingspunt
 - Medicamenteus
 - Niet medicamenteus
 - Interventioneel
- Combinatietherapie



PIJN

Molenheide, 11 april 2018

Koen Lauwers

Gert Huysmans


*Pijn is een onaangename sensorische
of emotionele ervaring samenhangend
met actuele of potentiële
weefselbeschadiging of beschreven in
termen van een dergelijke
beschadiging*

International association for the Study of Pain

*Pijn is datgene wat een persoon die
het ervaart zegt dat het is en is
aanwezig wanneer hij/zij zegt dat het
aanwezig is*

Mc Caffery

- Acute pijn >< chronische pijn
- Maligne pijn – niet maligne pijn
- Pijngeheugen
 - Modulatie
 - Modificatie
- Pijngedrag



Pijnbelevingsmodel volgens Loeser

Voorkomen

- 18 % ? volwassen bevolking
 - Hoofdpijn
 - Gewrichtspijnen
 - rugpijn
 - ...
- Vergeevorderd stadium na kanker 64 %
 - Pancreas, oesophagus 80%
 - Long, maag, prostaat, borst, cervix, ovarium 70-80 %
 - Orofarynx, colon, hersenen, nier, blaas 60-70 %
 - Hematologische maligniteiten 50-60 %

Voorkomen

- AIDS 40-50 % (80 % opgenomen patiënten)
- ALS 60-70 %
- Multipele sclerose 50-60 %
- Hartfalen 41 %
- COPD 68 %
- Terminale nierinsufficiëntie 40 %

Pijn als symptoom bij ouderen

- Onderrapportage
- Onderdiagnose
 - 40 à 80 % rusthuisbewoners heeft pijn
 - 50 % wordt correct behandeld
 - 20 % dementerenden wordt correct behandeld



Vergelijking van pijnbehandeling t.g.v. heupfractuur bij gevorderd dementeren en cognitief valiede bejaarden

Journal of Pain and Symptom Management vol. 19 No. 4 April 2000

niet-dementerend

dementerend

N	95	38
pijnschaal	0 tot 4	niet te testen
N = 4	40%	niet te testen
Opiaten	100	33
Routine analgesie	17%	24%


Gevolgen van onderbehandelde pijn

- Depressie ↑
- Sociale deprivatie ↑
- Slaapstoornissen ↑
- Mobiliteit ↓
- Gebruik gezondheidszorg ↑
- Revalidatie ↓
- Impact op zorgverleners ↑


FUNCTIONALITEIT






LEVENSKWALITEIT




PSYCHISCHE STRESS













A-delta vezel




C-vezel





- Elke behandeling eigen aangrijpingspunt
 - Medicamenteus
 - Niet medicamenteus
 - Interventioneel
- Combinatietherapie




Prezi

Klik op tekening om Prezi te starten

Gert en ik danken de
organisatoren voor de
reis naar het mooie
Limburg

géén sponsoring

Wij zijn er zeker van
dat jullie iets zullen
bijleren !



Domus Medica congres 2018

Molenheidestraat 7

Houthalen-Helchteren

1a. Ik heb een kop koffie gedronken vanmorgen.

POLL
OPEN

1. Ja



2. Neen



1 b. Ik heb suiker toegevoegd aan mijn ochtenddrank

POLL
OPEN

1. Ja



2. Neen



1c. Ik heb gisteren 2 pintjes of glazen wijn gedronken, kon daarmee slaan nog niet vatten en heb dan maar een inslaper ingenomen....”

POLL
OPEN

1. Ja

1.27%

2. Neen, maar ik zou ervoor uitkomen als dat dat zo was

97.47%

3. Ik durf daar niet voor uitkomen

1.27%

2 Aantal patiënten met problemen van afhankelijkheid/abusus/addictie aan opioïden

POLL
OPEN

1. 10% of meer




2. Minder dan 10%



3 Chronische pijn is pijn die minstens 6 maanden duurt

POLL
OPEN



4, Wie heeft er al ooit iets gehoord over vlaggen rond pijn ?

POLL
OPEN

1. Ik wel



2. Ik niet

