



2007

Het gamma van TMF excipiëntia

Officiële benamingen

Zalven: hydrofobe zalf
hydrofiele zalf

Crèmes: lipofiele crème (vet)
hydrofiele crème (niet vet)

Gel: hydrofiele gel

Pasta's: waterpasta
lipofiele pasta

Altijd "TMF" toevoegen

Het gamma van TMF excipiëntia

hydrofobe zalf
lipofiele pasta

lipofiele crème
hydrofiele crème
emulsie

Hydrofiele gel
hydrofiele zalf
waterpasta
waterige oplossing

vet watervrij

gemengd

waterig



Excipiëntia Concreet

Hydrofobe zalf:

- Vaseline
- Vaseline + 30% vloeibare paraffine

Lipofiele crème:

- Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat
TMF = AVA-crème = Aqua Vaseline Arlacel
- (Cold cream)

Emulsie:

- Hydrofiele anionische emulsie
- (Gebufferde) Cetomacrogol emulsie

Excipiëntia concreet

Hydrofiele crème:

- (Gebufferde) Cetomacrogolcrème TMF
- Hydrofiele anionische crème TMF
- Beeler basis

Hydrofiele gel:

- Carbomeergel TMF

Pasta's:

- Waterpasta TMF (talk, zinkoxide, glycerol, water)
- Lipofiele pasta TMF (vaseline, gezuiverde sesamolie, vaseline)

Excipiëntia concreet

Hydrofobe zalf TMF

= witte vaseline + vloeibare paraffine (70/30)

- geschikt voor zeer droge huid, hyperkeratose, psoriasis...
- occlusief effect : versterkt actie van het geneesmiddel
- niet geschikt voor gelaat, hoofdhuid en behaarde zones

Excipiëntia concreet

Lipofiele crème TMF

= waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat

= vaseline gehydrateerd met Arlacel (emulgator)

- meer geschikt voor droge huid
- weinig irritatie of allergie
- aanvaardt de meeste geneesmiddelen

Excipiëntia concreet

Hydrofiele crème TMF

= (gebufferde) cetomacrogolcrème

- geschikt voor vochtige aandoeningen (acut, subacut)
- **Gebufferde: pH 5: ideaal voor corticoïden**
- **Niet-gebufferde: pH > 6,5: ideaal voor erythromycine**
- heel weinig irritatie of allergie
- aanvaardt de meeste geneesmiddelen

Excipiëntia concreet

Hydrofiele gel TMF

Lichte, waterige gel, zonder vet

- geschikt voor gelaat, hoofdhuid en behaarde zones
- soms irriterend (▽! zuigelingen)
- blijft minder lang op de huid.

Excipiëntia concreet

De pasta's

Beschermende en kalmerende basissen

- beschermen de huid met een fijne laag poeder (zinkoxide)
- kunnen vocht opnemen
- worden gebruikt met of zonder geneesmiddel
- niet geschikt voor het gelaat

Excipiëntia concreet

Indicaties pasta's

1. Waterpasta

vochtige akute dermatoses,
vochtige luierslag, windpokken

2. Lipofiele pasta

droge dermatoses, psoriasis,
droge luierslag, licht eczeem

Hoe het excipiëns kiezen?

Principe:

vet op droog

nat op nat

Hoe het excipiëns kiezen?

Zeer droge huid →
excip. **VET**

Vochtige huid →
excip. **GEMENGD** of
ZONDER VET

hydrofobe zalf
lipofiele pasta
(lipofiele crème)

crèmes, gel,
waterpasta,
oplossingen

Speciale keuze volgens locatie

Gelaat,
hoofdhuid

Overdag, lichte basis:
oplossing, gel, emulsie

Behaarde of
uitgebreide
zone

Crèmes, gel, emulsie

Opgelet, bij zuigelingen en jonge kinderen

oplossingen (alcoholische en
hydroalcoholische)
en gel kunnen irriteren.

Waarom zijn sommige basissen niet meer weerhouden in het TMF?

- ✓ **Unguentum Simplex**
 - Bevat lanoline die allergiserend kan zijn
- ✓ **Beelerbasis**
 - Propyleenglycol, Na laurylsulfaat: irriterend
- ✓ **Cold crème**
 - Geen standaardisatie en instabiliteit met talrijke bestanddelen
- ✓ **Eucerine cum Aqua**
 - Bevat lanoline die allergiserend kan zijn

Die basissen bestaan wel nog en mogen nog voorgeschreven worden.

Houdbaarheid TMF formules

Met bewaarmiddelen → 2 maanden

Zonder bewaarmiddelen → 8 dagen

Overzicht bewaarmiddelen:

- Sorbinezuur → waterhoudende vaseline met sorbitansequiolaat TMF
- Kaliumsorbaat → (gebufferde) cetomacrogol TMF
- Aqua conservans (water voor bewaring) → hydrofiele anionische creme TMF

Dermocorticoïden

+	Hydrocortisonacetaat Cortril®, Cremicort®	1 %
++	Triamcinolonacetonide Delphi®	0,1 %
	Clobetasonbutyraat Eumovate®	0,05 %
+++	Betamethasonvaleraat Betnelan V®	0,121 %
	Diflucortolonvaleraat Nerisona®	0,1 %
++++	Diflucortolonvaleraat Nerisona <u>forte</u> ®	0,3 %
	Betamethasondipropionaat Diprolene®, Diprosone®	0,05 %
	Clobetasolpropionaat Dermovate®	0,05 %

Dermocorticoïden: goed gebruik

- Volg aanbevolen **concentraties**. Bij hogere concentraties kunnen ongecontroleerde effecten optreden.
- Voorgeschreven **hoeveelheid** beperken in functie van potentie van de bereiding
 - > Max. 50 g bij:
 - Zeer sterk werkzame corticosteroïden
 - Associaties met salicylzuur
- Geen **associaties** van corticosteroïden
- **Prednisolone** is niet weerhouden wegens onvoldoende penetratie in de huid
- **Gelaatsbehandeling**: enkel hydrocortisone is aangewezen!!!

Bereidingen

1. Enkel corticosteroiden

a. Betamethasondipropionaat

Hydrofobe zalf 0,064%
Hydrofiele crème 0,064%
Hydroalcoholische oplossing 0,064%

b. Clobetasolpropionaat

Hydrofobe zalf 0,05%
Hydrofiele crème 0,05%
Hydroalcoholische oplossing 0,05%

c. Diflucortolonvaleraat

Lipofiele crème 0,3%
Hydrofobe zalf 0,1%
Lipofiele crème 0,1%
Hydrofiele crème 0,1%

d. Betamethasonvaleraat

Hydrofobe zalf 0,121%
Hydrofiele crème 0,121%
Hydroalcoholische oplossing 0,121%

e. Clobetasonbutyraat

Hydrofobe zalf 0,05%
Lipofiele crème 0,025%
Hydrofiele crème 0,025%

Bereidingen

- | | |
|--------------------------|---|
| f. Triamcinolonacetonide | Hydrofiele crème 0,1%
Hydrofiele gel 0,1%
Alcoholische oplossing 0,1% |
| g. Hydrocortisonacetaat | Hydrofiele crème 1% |

2. Associaties met corticosteroiden

a. Betamethasondipropionaat en salicylzuur

Hydrofobe zalf met 0,064%
betamethasondipropionaat en met
3% salicylzuur

Hydroalcoholische oplossing met
0,064% betamethasondipropionaat
en met 3% salicylzuur

b. Clobetasolpropionaat en salicylzuur

Hydroalcoholische oplossing met
0,05% clobetasolpropionaat en met
3% salicylzuur

Acne

De therapeutische keuze

- acne op gelaat → discrete basis : oplossing of gel
- subacut → eerder gel (werkt langer)
- geïnfecteerd → topisch antibioticum

Acne

Clindamycine

Hydro-alcoholische oplossing aan 1,5% TMF NT

Erythromycine

Hydrofiele gel aan 2% of 4% TMF T

Hydro-alcoholische oplossing 4% TMF T

Hydrofiele crème met 4% erythromycine en 1%
metronidazool TMF T

Alcoholische oplossing met 4% erythromycine en 0,8%
zinkacetaat TMF NT

Acne: uw formules

Acné – lotion

Aluin 2 gr
resorcine 2 gr
boorzuur 2 gr
erythromycine 2 gr
ontsmettingsalcohol 60 ° AD 300 ml
DT 1 lotio U.G.
S/ 2 X / D

Opmerkingen

pH voor erythromycine is kritisch → best afzonderlijk
Dit is een oude formule die problemen oplevert bij de bereiding ervan (neerslagvorming)

Androgene alopecie

Minoxidil

Hydro-alcoholische oplossing 2% TMF

NT

Androgene alopecie: uw formules

haaruitval diffuus (idem regaine)

minoxidil 2g
propyleenglycol 10g
aqua 20 ml
spiritus 93° ad 100 ml

Opmerkingen

Formule is OK

Eenvoudiger = TMF titel noteren op het VS. Dit verhindert fouten want de TMF formules worden soms aangepast → meer zekerheid dat de apotheker altijd de juiste formule gebruikt.

Bereiding NTB → mogelijkheid tot hernieuwing van het VS

Nota: conc. kan verhoogd worden tot 5% (indien > 2% → VS plichtig)

Desinfectans

Chloorhexidinedigluconaat

Hydro-alcoholische oplossing 0,5% TMF

NT

Jood

Hydro-alcoholische oplossing 1% TMF

T

Opmerkingen

Terugbetaling Chloorhexidine: enkel indien andere actieve bstd aanwezig zijn

Houdbaarheid jood!

Ichtyose, Hyperkeratose

Ureum

Lipofiele crème 10% TMF	T
Hydrofiele crème 10% TMF	T
Lipofiele crème met 5% ureum en 5% natriumchloride TMF	T

Ichtyose, Hyperkeratose: uw formules

droge huid

ureum 5%
zachte amandelolie 5%
coldcreme ad 300g

droge huid

ureum 5%
zachte amandelolie 10%
in AVA

Opmerkingen

Wat is de toegevoegde waarde van amandelolie?
Opmerking cold cream: verschillende formules en terugbetalingen

Ichtyose, Hyperkeratose: uw formules

droge huid (AVA-zalf)

**ureum 2g
aralcel 6g
vaseline 54g
aqua ad 100g**

Opmerkingen

Beter noteren: ureum x% in lipofiele creme TMF

Ichtyose, Hyperkeratose: uw formules

droge huid: olie

Saponine koolteer	1 g
Dehydol 50	25 ml
Cetiol V	35 ml
Emulgin 0 5	50 ml
Amandelolie (zoete)	50 ml
Comperlan KD	40 g
Paraffine liquid	ad 500 ml
fiat oplossing	
dt. 500 ml	
S/ 1 maal 's avonds	

Voorstel:

Saponine koolteer	1 g
Cetiol V	35 ml
Eumulgin O 5	75 ml
Amandelolie (zoete)	50 ml
Comperlan KD	40 g
Paraffine liquid	ad 500 ml
fiat oplossing	
dt. 500 ml	
S/ 1 maal 's avonds	

Opmerkingen

Emulgin 0 5 → Eumulgin O 5 → niet terugbetaald
Dehydol 50 → niet beschikbaar

Huidinfecties (bacteriën en schimmels)

Clioquinol (Vioform)

Hydrofobe zalf 3% TMF	T
Lipofiele pasta 3% TMF	T
Hydrofiele crème 3% TMF	T
Hydrofiele gel 3% TMF	T
Waterpasta 3% TMF	T

Chloorhexidinedigluconaat

Waterige oplossing 0,05% TMF	NT
------------------------------	----

Joodpovidon

Hydrofiele zalf 10% TMF	NT
Waterige oplossing 10% TMF	NT

Kaliumpermanganaat

Waterige oplossing 0,025% TMF	T
-------------------------------	---

Jeuk (met inflammatie)

Triamcinolonacetonide

Hydrofiele gel 0,1% TMF

T

Eczeem

Atopisch eczeem

3 behandelingen:

- vette crème, zonder geneesmiddel
- ureum (jeukstillend & hydraterend)
- corticoïde

Eczeem

voorschrift met **lipofiele crème**

R/ Lipofiele crème TMF. Dt 100 g

S/ 's avonds aanbrengen.

voorschrift met **ureum**

R/ Lipofiele crème met 5 à 10% ureum TMF Dt 50 g

S/ 's avonds aanbrengen.

's morgens: idem, met hydrofiele crème

Kleine kinderen: laag doseren (1 – 3 %)

Eczeem

voorschrift met corticoïden

WERKZAAMHEID	BENAMING	TERUGBETAL
zwak werkzaam corticosteroïde	Hydrocortisonacetaat *hydrofiële crème 1 % TMF	Ja
vrij sterk werkzaam corticosteroïde	Triamcinolonacetonide *hydrofiële crème 0,1 % TMF *hydrofiële gel 0,1 % TMF *alcoholische oplossing 0,1 % TMF	Ja
	Clobetasonbutyraat *hydrofobe zalf 0,05 % TMF *lipofiele crème 0,05 % TMF *hydrofiële crème 0,05 % TMF	Ja
sterk werkzaam corticosteroïde	Betamethasonvaleraat *hydrofobe zalf 0,121 % TMF *hydrofiële crème 0,121 % TMF *hydroalcoholische oplossing 0,121 % TMF	Ja
	Diflucortolonvaleraat 0,1% *hydrofobe zalf 0,1 % TMF *lipofiele crème 0,1 % TMF *hydrofiële crème 0,1 % TMF	Ja
zeer sterk werkzaam corticosteroïde	Diflucortolonvaleraat 0,3% *lipofiele crème 0,3 % TMF	Ja
	Clobetasolpropionaat *hydrofobe zalf 0,05 % TMF *hydrofiële crème 0,05 % TMF *hydroalcoholische oplossing 0,05 % TMF *hydroalcoholische oplossing met 0,05 % clobetasolpropionaat en 3 % salicylzuur TMF	Ja
	Betamethasonedipropionaat *hydrofobe zalf 0,064 % TMF *hydrofiële crème 0,064 % TMF *hydroalcoholische oplossing 0,064 % TMF *hydrofobe zalf met 0,064 % betamethasonedipropionaat en 3 % salicylzuur TMF *hydroalcoholische oplossing met 0,064 % betamethasonedipropionaat en 3 % salicylzuur TMF	Ja

Eczeem: uw formules

Eczeem

Chloorhexidine 0,6 g
Salicylzuur 1,2 g
Diflucortolonvaleraat 30 mg
Enkelvoudige zalf 30 g
Ung. cetylicum ad 60 g
Fsa zalf DT 60 g
S/ 2 x per dag

Opmerkingen

Waarom Chloorhexidine?
Waarom Enkelvoudige zalf en Ung. cetylicum?

Eczeem: uw formules

Eczemateuze huiduitslag

hydrofiele creme met 0,1% triamcinolonacetonide TMF DT 50 gr

Eczeem

**Clobetasol 17mg
Propionaat 15mg
in cetomacrogol creme ad 100g**

Opmerkingen

Verkeerd VS: actieve stof = Clobetasolpropionaat

Vb formule is Hydrofiele creme met 0,05% Clobetasolpropionaat TMF

Eczeem: uw formules

Eczeem onderhoud

Ureum 15 g
Arlacel 83 6 g
Witte vaseline 54 g
Aqua ad 100 g
FSA zalf - DT 300 g
S/ 2 maal per dag

Opmerkingen

Deze formule is eigenlijk = lipofiele creme met 5% ureum TMF

Eczeem: uw formules

Eczeem seborrhoisch

hydrocortisone 1%
LCD 20%
salicylzuur 3%
vioforme 3%
in beelerbasis ad 100 gr
DT pot 100gr
S) 1-2*/dd (vb in gelaat)

Opmerkingen

Waarom beelerbasis?

Hydrocortisone zalf

Hydrocortisone 0,5 %
Beeler Base ad 50 g
Dt 1 zalf
S 2x/d gedurende 1 week
Daarna 1 x/d gedurende 1 week

Keratolytica

Salicylzuur

Hydrofobe zalf 20%, 30% of 40% TMF

T

Viskeuze oplossing 5% TMF

T

Keratolytica: uw formules

Bij veel schilfering:

Clobetasolpropionaat 0,05%
Salicylzuur 1,5 g
Tween 80 1,5 g
Ung cetylicum BF5-MF ad 30 g
f. cremor
dt. 30 g
S/ Nachtzalf

Opmerking

Nut van cortisone?

Associatie van cortico + salicylzuur → andere toepassing

Wratten

Therapeutische keuze:

Wrat → sterk gedoseerd keratolyticum

Basis → vette, watervrije zalf
(maximale werking)

Wratten: uw formules

Wratten

salicylzuur 4 gr
resorcine 3 gr
recinusolie 1 druppel warm te incorporeren
ad 10 gr vaseline

Salicylzuur 10gr
benzoëzuur 7gr
lanoline 16gr
vaseline 17gr
DT tube 50gr

S) dagelijks of om de twee dagen op de wratten aanbrengen na
afpellen van losse delen.

Opmerking

Obsoleete formules

Zie keratolytische formule TMF

Luizen

Malathion

Alcoholische oplossing 0,5% TMF

NT

Permethrine

Hydrofiele crème 5% TMF

NT

Emulsie 1% TMF

NT

Mycose

Econazoolnitraat

Hydrofiele crème 1% TMF	T
Poeder 1% TMF	T
Emulsie 1% TMF	NT

Miconazoolnitraat

Hydrofiele crème 2% TMF	T
Emulsie 2% TMF	T
Poeder 2% TMF	T

Mycose (candidose)

Nystatine

Hydrofiele crème 100.000 I.E./g TMF

T

Mycose: uw formules

Mondspoeling (beslag op tong, zeepsmaak)

Lidocaine HCl 400mg

Nystatine Labaz 1 flacon (2,4milj IE)

Propyleenglycol 10ml

Na-CMC (2000mPa.S) 2g

Aqua purificata as 500 ml

Mondinfectie

prednisolone 80 mg

lidocaine 160 mg

nystat 1000000 IE

nacnc 800 mg

propyleenglycol 4 ml

aqua tot 200 ml

Opmerkingen

Labaz → vervangen door de grondstof

Na-CMC → 2000 mPa.s is niet beschikbaar (best weglaten)

Luierdermatitis

3 gevallen :

- droog
- met vrijkomend vocht
- geïnfecteerd.

Luierdermatitis

- 1) droge luierslag
vette, beschermende isolatiebasis,
→ **lipofiele pasta** (zonder act. best.)
- 2) vochtige luierslag
absorberende en beschermende
pasta → **waterpasta** (zonder act. best.)
- 3) geïnfecteerde luierslag
→ **nystatinecrème**

NOTA: (zinkoxide)pasta met miconazol is NT

Luierdermatitis: uw formules

Luierdermatitis geïnfecteerd

erytromycine 1,2 g
prednisolone 0.3 g
nystatine 2,4 10 000 000 E
cetylcreme ad 60 g
2/d max 5d

Opmerkingen/

Gebruik van cortisone en erythromycine voor luierdermatitis is
obsoleet!

Luierdermatitis

zinkoxydezalf 60g
nystatin 1 000 000 E

Opmerkingen:

Opsplitsen!

Psoriasis

droog, schilferig,
chronisch

Psoriasis

Therapeutische keuze:

- psoriasis → zeer potente corticoïde
- droog, chronisch → vette zalf
- schilferig → keratolyticum associëren

Psoriasis

Dithranol

Hydrofobe zalf 0,10% / 0,25% / 0,50%
of 1% TMF

T

Lipofiele pasta 0,10%, 0,25%, 0,50%
of 1% TMF

T

Ichtammol

Hydrofobe zalf 20% TMF

T

Psoriasis: uw formules

Psoriasis dagcrème

Clobetasolpropionaat 0,05%
Salicylzuur 1,5 g
Cetomacrogolcrème ad 30 g
f. cremor
dt. 30 g
S/ Dagcrème

Psoriasis nachtzalf

Clobetasolpropionaat 150 mg
Emulgerende zalf ad 300 g
f. cremor
dt. 300 g
S/ Nachtzalf

Opmerkingen

1. Hydrofiele creme TMF
2. Emulgerende zalf is een prima keuze omdat deze wasbaar is

Psoriasis: uw formules

Psoriasis lotio:

Clobetazol propionaat 50 mg
Salisylzuur 3 g
Hydroxypropylcellulose 1 g
Isopropanol 70 ml
Water ef ad 100 ml

f. lotio

dt. 100 ml

S/ 's avonds

Psoriasis

Betnelancreme 192mg

salicylzuur 5%

Cetomacrogolcreme ad 300g

DT pot 300 gr

S) 2*/dd op schilferende letsels (in afwisseling periodisch met Daivonex)

Opmerkingen

1 en 2 Vervangen door TMF formule

2. Betnelan crème 192 mg?

Rosacea

Metronidazool

Hydrofiele crème 1% TMF

T

Rosacea: uw formules

Rosacea

Hydrocortisoneacetaat 0,6 g
Metronidazole 2,4 g
Beeler basis NF5 ad 60 g

Opmerking

Opsplitsen!
Hydrofiele crème TMF

Schurft

Permethrine

Hydrofiele gel 5% TMF

NT

Hydrofiele creme 5% TMF

NT

(= Zalvor®)

Transpiratieremmer

Aluminiumchloride

Transpiratieremmende hydro-alcoholische
oplossing 15% TMF

T

Transpiratieremmer: uw formules

Zweetvoeten

Aluminiumhydrochloridehexahydraat	10%
Beeler basis	ad 100g

Opmerkingen

Beeler is OK. Zou mogen vervangen worden door hydrofiele anionische creme TMF

Overige formules

PCID – zalf

Prednisolone 0,3 g
Chlooramphenicol 1,2 g
Ictiol aa 10g
Aqua aa 10g
Zinkoxide aa 10g
Vaseline aa 10g
Lanoline ad 60g
Dt 1 tube

Opmerkingen

Obsoleet!

Overige formules

Aften

lidocaine HCL 1000mg
tetracycline HCL 1000mg
triamcinoloneacetonide 500mg
muntspiritus 3g
sirup simplex BF5 ad 100ml

benzocaine 1.5g
hydrocortisoneacetaat 300mg
muntvlugolie II druppels
beschermende mond pasta NF VI ad 30g

Opmerkingen

Voor TC → gelules voorschrijven om te spoelen!
Onverenigbaarheid tussen lidocaine en TC!

2^{de} formule is correct!

Overige formules

**ingegroeide en geïnfecteerde nagel, erysepelas,
furonkel, vreemd lichaam diep gelegen**

**hydrocortisone 1%
chloramfenicol 2%
ichtyol 1,8%
vaseline
zinkoxide aa 10g
water
2/d**

Opmerkingen

**Waarom hydrocortisone en chloramfenicol?
Enkel ichtyol en vaseline noodzakelijk!**

Overige formules

Neus (vasodilaterend)

Naboraat 500mg

Eucalyptol 150mg

Efedrine HCl 610mg

Vaseline 20g

Amendelolie 5g

Paraffine-olie 5g

prev + osteoporose

calciumbicarbonaat 1000 mg

Opmerkingen

1. Efedrine mag enkel uitwendig + bereiding is niet terugbetaald
2. Gelules kunnen verschillen van grootte + wel TB

SPECIALITEITEN	ACTIEVE BESTANDDELEN	SPECIALITEITEN	ACTIEVE BESTANDDELEN
ACNERINE ®	Erythromycine	HIBIGUARD ®	Chloorhexidinedigluconaat
AKNEMYCINE ®	Erythromycine	HIBITANE ®	Chloorhexidinedigluconaat
AXITRANS ®	Aluminiumchloride	INDERM ®	Erythromycine
BETNELAN V ®	Betamethasonvaleraat	ISO-BETADINE ®	Joodpovidon
BITHIOL ®	Ichtammol	IODEX ®	Joodpovidon
BRAUNODERM ®	Joodpovidon	MEFREN ®	Chloorhexidinedigluconaat
BRAUNODINE/BRAUNOL	Joodpovidon	MICANOL ®	Dithranol
CALMURID ®	Ureum	NEOXIDIL ®	Minoxidil
CORTRIL ®	Hydrocortisonacetaat	NERISONA ®	Diflucortolonvaleraat
CREMICORT ®	Hydrocortisonacetaat	NIX ®	Permethrine
DAKTAR ®	Miconazoolnitraat	NOZEMA ®	Hydrocortisonacetaat
DAKTARIN ®	Miconazoolnitraat	NYSTATINE ®	Nystatine
DALACIN ®	Clindamycine	PANNOCORT ®	Hydrocortisonacetaat
DELPHI ®	Triamcinolonacetonide	PRIODERM ®	Malathion
DERMOVATE ®	Clobetasolpropionaat	PEVARYL ®	Econazoolnitraat
DIPROLENE ®	Betamethasondipropionaat	RADIKAL ®	Malathion
DIPROSALIC ®	Betamethasondiprop. +salicylzuur	REGAINE ®	Minoxidil
DIPROSONE ®	Betamethasondipropionaat	ROSEX ®	Metronidazool
DUOFILM ®	Salicylzuur	STERILON ®	Chloorhexidinedigluconaat
ERYDERM ®	Erythromycine	STIMYCINE ®	Erythromycine
EUMOVATE ®	Clobetasolbutyraat	TOPIK ®	Betamethasonvaleraat
EURAX ®	Crotamiton	ZALVOR ®	Permethrine
HIBIDIL ®	Chloorhexidinedigluconaat	ZINERYT ®	Erythromycine + zinkacetaat

ACTIEVE BESTANDDELEN	SPECIALITEITEN	ACTIEVE BESTANDDELEN	SPECIALITEITEN
Salicylzuur	DUOFILM ®	Erythromycine	STIMYCINE ®
Aluminium chloride	AXITRANS ®	Erythromycine + zincacetaat	ZINERYT ®
Betamethasonpropionaat	DIPROLENE ®	Ichtammol	BITHIOL ®
Betamethasonpropionaat	DIPROSONE ®	Hydrocortisonacetaat	CREMICORT ®
Betamethasonprop.+ salicylzuur	DIPROSALIC ®	Hydrocortisonacetaat	CORTRIL ®
Betamethasonvaleraat	BETNELAN V ®	Hydrocortisonacetaat	NOZEMA ®
Betamethasonvaleraat	TOPIK ®	Hydrocortisonacetaat	PANNOCORT ®
Chloorhexidinedigluconaat	HIBIDIL ®	Malathion	PRIODERM ®
Chloorhexidinedigluconaat	HIBIGUARD ®	Malathion	RADIKAL ®
Chloorhexidinedigluconaat	HIBITANE ®	Metronidazool	ROSEX ®
Chloorhexidinedigluconaat	MEFREN ®	Miconazoolnitraat	DAKTAR ®
Chloorhexidinedigluconaat	STERILON ®	Miconazoolnitraat	DAKTARIN ®
Clindamycine	DALACIN ®	Minoxidil	NEOXIDIL ®
Clobetasolbutyraat	EUMOVATE ®	Minoxidil	REGAINE ®
Clobetasolpropionaat	DERMOVATE ®	Nystatine	NYSTATINE ®
Crotamiton	EURAX ®	Permethrine	NIX ®
Diflucortolonvaleraat	NERISONA ®	Permethrine	ZALVOR ®
Dithranol	MICANOL ®	Joodpovidon	BRAUNOL ®
Econazoolnitraat	PEVARYL ®	Joodpovidon	BRAUNODERM ®
Erythromycine	ACNERINE ®	Joodpovidon	IODEX ®
Erythromycine	AKNEMYCINE ®	Joodpovidon	ISO-BETADINE ®
Erythromycine	ERYDERM ®	Triamcinolonacetonide	DELPHI ®
Erythromycine	INDERM ®	Ureum	CALMURID ®



Persoonlijke creaties

De voorschrijver blijft vrij om
« zijn » formules te
gebruiken.

**Bedankt voor uw
aandacht.**

**Bezoek onze interessante
website :**

www.mfk.be